6 أعراض لسرطان القولون لا يجب تجاهلها أبدًا



الأحد 23 نوفمبر 2025 06:00 م

سرطان القولون هو نمو للخلايا يبدأ في جزء من الأمعاء الغليظة يسمى القولون□ وغالبًا ما يبدأ على شكل سلائل (أورام حميدة) قد تتطور بمرور الوقت إلى أورام سرطانية□

ويصيب سـرطان القولـون كبـار السن بشـكل رئيس، مع أن حالاـت الإصابـة بين من هم دون سن الخمسـين آخـذة في الارتفـاع، وفقًـا لمنظمة ماكميلان لدعم مرضى السرطان في بريطانيا□

وحـددت الخبيرة الطبيـة، الـدكتورة سانـا سادوكساي في مقطع فيـديو عبر تطبيق "تيك توك"، 6 علامات للإصابـة بسـرطان القولون حذرت من تحاهلها، تشمل:

- 1 الإمساك أو الإسهال
- 2 براز رقيق مثل قلم الرصاص لا يعود إلى طبيعته
 - 3 فقدان الوزن غير المبرر
 - 4 التعب المستمر على الرغم من النوم الجيد
 - 5 نزول الدم أثناء الحمام
 - 6 الشعور الدائم بعدم إفراغ الأمعاء

وأضافت: "هذه الأعراض لا تعني بالضرورة الإصابة بالسرطان، ولكنها قد تعني ذلك أحيانًا□ والكشف المبكر عنه قد ينقذ حياتك حقًا".

ما الذي يسبب سرطان القولون؟

وفقًا لمنظمة ماكميلان، لا زالت أسباب سرطان القولون مجهولة، مع أن بعض عوامل الخطر قد تزيد من احتمالية الإصابة به، وفقًا لصحيفة ميرور□ وتشمل هذه العوامل:

العمر: حوالي أربع من كـل 10 حالات من سـرطان القولون التي تم تشخيصـها في المملكـة المتحدة تصـيب الأشـخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 75 عامًا وأكثر□

النظام الغذائي**:** تناول كميـات كبيرة من اللحوم الحمراء والمصـنعة يمكن أن يزيـد من خطر الإصابـة بسـرطان القولون، فضـلاً عن عـدم تنـاول كمية كافية من الألياف□

الوزن: يمكن أن يؤدي الوزن الزائد إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان القولون، وبخاصة عند الرجال□

قلة النشاط البدني: الأشخاص الذين يقضون وقتًا طويلًا في الجلوس أو عدم ممارسة أي نشاط بدني هم أكثر عرضة للخطر□

شرب الكحول: حوالي 6 بالمائة من حالات الإصابة في المملكة المتحدة مرتبطة بشرب الكحول□

التدخين

التاريخ العائلي**:** في حـال إصابـة أحـد أفراد العائلـة بسـرطان القولـون، فـإن ذلـك لاـ يزيـد مـن خطر الإصابـة، لكـن إذا أصـيب العديـد من أفراد العائلة المقربين بالمرض، فقد يكون الخطر أعلى

التهـاب الأمعاء**:** تشــمل التهــاب القولـون التقرحي وداء كرون□ ينصــح المصـابون بـإجراء فحص أمعـاء دوري□ لكـن هــذا لاـ يشــمل متلاـزمة القولون العصبى، وهى ليست حالة التهاب معوى□

مرض السكري من النوع الثاني: الأشخاص المصابون بهذه الحالة معرضون لخطر أكبر للإصابة بسرطان الأمعاء□

كيف يتم تشخيص سرطان القولون؟

على أي شخص يخشى من ظهور أعراض سـرطان القولون استشارة الطبيب لفحص منطقة البطن بحثًا عن أي كتل أو تورم□ قد يتطلب الأمر إجراء فحوصات تنظير القولون، وخزعة الأنسجة، وفحوصات الدم، وإجراءات أخرى□

ويتم تشخيص سرطان القولون أيضًا في بعض الأحيان في المستشفى بعد دخول شخص ما إلى المستشفى لأسباب مثل انسداد الأمعاء□