


أربع مراحل للبواسير؟ ما هي؟



السبت 17 فبراير 2018 12:02 م

البواسير هي تضخم أو التهاب للأوعية الدموية في القناة الشرجية ويتطور المرض في أربع مراحل

ووفقا لموقع "نيت دكتور" الإلكتروني الألماني فإن هذه المراحل هي:

المرحلة الأولى: يكون تضخم الأوعية الدموية قد جرى على الأغلب في منطقة واحدة داخل القناة الشرجية

المرحلة الثانية: تظهر الأوعية الدموية المتضخمة أثناء التبرز، ثم تعود للداخل لوحدها في القناة الشرجية

المرحلة الثالثة: الأوعية الدموية المتضخمة تبرز خارج فتحة الشرج ولا تعود لوحدها في القناة الشرجية، ولكن يمكن إرجاعها للداخل عبر الضغط عليها

المرحلة الرابعة: تبقى الأوعية الدموية المتضخمة خارج الشرج بشكل مستمر ولا يمكن إرجاعها داخله

وقال الطبيب ديرك فيلهيلم المسؤول عن الجراحة العامة والجراحة والحشوية الخاصة في مستشفى يمين إزار التابع للجامعة التقنية في ميونيخ، لمجلة فوكوس الألمانية، إن البواسير في مراحل المرض الأربع يمكن أن تتسبب بنزيف في منطقة الشرج، وأضاف أنه في المرحلة الأولى والثانية يمكن أن يخرج الدم مع التبرز

ويمكن معالجة المرض في المرحلتين الأوليين موضعيا، عبر استخدام المراهم، أما في المرحلة الثالثة والرابعة من البواسير فيكون علاجها عبر تدخل جراحي

وأشار الدكتور فيلهيلم إلى أن التدخل الجراحي واستئصال الأوعية الدموية المتضخمة يمنع ظهور البواسير عند المريض من جديد في هذه المنطقة، لكن يمكن أن تظهر البواسير في مواقع أخرى

وذكر فيلهيلم أن البواسير تظهر عادة في ثلاث مناطق في الشرج، وإذا تم علاج هذه المناطق جميعها عبر التدخل الجراحي، فهذا يعني أن المريض قد تخلص تقريبا وبصورة نهائية من الإصابة بالبواسير